

Schutzimpfungen – wann – wie oft – wogegen

Teil II

Liebe Collie-Freunde,

in der Juni-Ausgabe 2011 der Collie Revue hatte ich in einem ausführlichen Artikel über die Grundimmunisierung von Welpen gemäß der Empfehlung der „Ständigen Impfkommision Vet.“ (StIKo) Stellung bezogen.

Zur Erinnerung: Vor der Übergabe veranlasste die Züchterin meinen Bearded Collie Welpen im Alter von acht Wochen die erste Impfung zur Grundimmunisierung. Anstatt nach der Empfehlung

Die anderen Werte im Einzelnen:

HCC-Titer 1:160 – Referenzwert < 1:20
Parvo-Titer 1:160 – Referenzwert < 1:20
Staupe-Titer 1:80 – Referenzwert < 1:20

Der Referenzwert < 1:20 gilt aktuell als Grenzwert, bei dem davon ausgegangen wird, dass keine Antikörper vorhanden sind.

Das Labor LABOKLIN erteilt grundsätzlich keine Impfempfehlung, auch nicht gegenüber dem konsultierten Tierarzt.

Vorstellen in der tierärztlichen Praxis) und Tag 21 (3 Wochen nach erfolgter Wiederholungsimpfung) Antikörpertiterbestimmungen für Staupe (CDV), Parvovirose (CPV) und Tollwut (TW) durchgeführt.

Ergebnisse und Bedeutung

Am Tag 0 zeigten unabhängig vom Impfstatus (regelmäßig oder unregelmäßig geimpfte Tiere)

84% der Hunde CDV-Antikörper-Titer